

Wichtige Informationen für eine geplante Vorhautoperation

Im OP Gebiet wurde eine örtliche Betäubung durchgeführt, die ca. 4-6 Stunden anhält. Wenn diese nachlässt, kann es zu Schmerzen kommen. Geben Sie dann bitte Fiebersaft oder -Zäpfchen (ein Rezept bekommen Sie von uns am OP-Tag) entsprechend dem Körpergewicht und der Dosierungsanweisung des Herstellers.

Bitte baden Sie Ihren Sohn in den ersten Tagen **2x täglich** für ca. **5 Minuten** im lauwarmen Wasser mit Kamillentee oder schwarzem Tee. Er kann im Sitzbad auch Urin lassen. Bitte kleben Sie eine Slipeinlage, welche mit Panthenol bestrichen ist, vorne in die Unterhose. Bei Kindern, die noch eine Windel tragen, kann die Creme dünn in die Windel aufgetragen werden.

Häufig kommt es vor, dass sich gelbliche Beläge auf der Eichel bilden. Dies ist kein Grund zur Sorge, sondern der normale Heilungsprozess.

Bei einer Teilbeschneidung ist die Vorhaut nach dem Sitzbad **2-3x täglich** zurückzustreifen. Dabei sollte möglichst der Unterrand der Eichel sichtbar werden. Auf die Eichel ist dann Bepanthen Augen- und Nasensalbe aufzutragen. Dies ist notwendig, um neuen Verklebungen vorzubeugen.

Die Fäden lösen sich nach 2 Wochen selbst auf.
Die Kontrolluntersuchungen sollten am **1. und 5. postoperativen Tag** bei dem Kinderarzt oder uns erfolgen.

In den ersten Tagen sollte Ihr Kind sich schonen, um eine starke Schwellung im Operationsgebiet zu vermeiden. In den Kindergarten oder in die Schule kann Ihr Kind meist wieder nach 1 Woche.
Sportunterricht sowie das Schwimmen/Baden sind nach 2 Wochen wieder möglich, Duschen nach 1 Woche.